

# SÉNÉGAL


## 2020-2021 Enquête sur les Indicateurs du Paludisme

L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Sénégal en 2020-2021 (EIPS-2020-2021) a pour objectif de collecter, analyser et diffuser des indicateurs relatifs à la population et au domaine du paludisme au Sénégal. L'EIPS-2020-2021 est le 3<sup>ème</sup> Enquête sur les Indicateurs du Paludisme menée au Sénégal.

### POSSESSION DES MII

#### Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) par grande région

Pourcentage de ménages ayant au moins une MII



**34 %** des ménages possèdent au moins 1 **moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)** pour 2 personnes dans le ménage.

**25 %** des ménages ne possèdent aucune MII.


### L'ACCÈS & UTILISATION DES MII

**58 %** de la population des ménages ont accès à une MII.

**46 %** de la population des ménages a dormi sous une MII la nuit avant l'interview.

#### Tendances de l'accès et utilisation des MII


Pourcentage de la population des ménages ayant accès à une MII et ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



### TPIg TENDANCES

#### Tendances du traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête qui, au cours de la grossesse la plus récente, ont reçu au moins 1, 2, ou 3 doses de SP/Fansidar



**38 %** des femmes enceintes ont pris 3+ doses de SP/Fansidar pour prévenir le paludisme pendant la grossesse.