


Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Mali 2021

La deuxième Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Mali (EIPM 2021) fournit des informations sur le paludisme.

UTILISATION DE MII

Tendances de l'utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes de 15-49 ans ayant dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête



EDSM-IV 2006	EDSM-V 2012-2013	EIPM 2015	EDSM-VI 2018	EIPM 2021
--------------	------------------	-----------	--------------	-----------

*Dans l'EDSM-V de 2012-2013 et l'EDSM-IV de 2006, les MII étaient appelées Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action (MILDA). Depuis 2012 au Mali, toutes les moustiquaires imprégnées d'insecticides sont presque exclusivement des MILDA.

73 % d'enfants de moins de 5 ans et


76 % de femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview.

FIÈVRE CHEZ LES ENFANTS

27 % d'enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'interview.


Diagnostic et recherche de soins pour des enfants avec de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre, pourcentage pour lesquelles



Prévalence du paludisme selon la région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat du TDR est positif



19 % d'enfants de 6-59 mois ont testés positifs pour le paludisme par test de diagnostic rapide.

LA PRÉVALENCE DU PALUDISME

PMI L'INITIATIVE PRÉSIDENTIELLE DES ÉTATS UNIS CONTRE LE PALUDISME

DIRIGÉ PAR

