

Santé de l'enfant au Sénégal selon l'Enquête Continue 2014

L'Enquête Continue au Sénégal collecte des données chaque année pour atteindre deux objectifs :

- 1) Répondre aux besoins permanents en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé et de population.
- 2) Renforcer des capacités des institutions du Sénégal dans le domaine de la collecte et de l'utilisation des données.


L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en collaboration avec le Ministère de la Santé et l'Action Sociale (MSAS), est chargée de la mise en œuvre de l'Enquête Continue qui comporte deux volets :

- **Le volet ménage** : appelé l'Enquête Démographique et de Santé (EDS-Continue), qui collecte des données auprès des membres des ménages, des femmes, des hommes et des enfants de moins de cinq ans.
- **Le volet structures de santé** : appelé l'Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS), qui collecte des données auprès des structures de santé, des prestataires de soins de santé et des clients des structures de santé.

MORTALITÉ DES ENFANTS


Tendances de la mortalité infanto-juvénile

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de cinq ans avant l'enquête



Mortalité infanto-juvénile par région

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de dix ans avant l'enquête




Ces résultats sont basés sur les données agrégées de 2012-2013 et 2014

Plus de **1** enfant sur **20** meurt avant son cinquième anniversaire.

DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ INFANTILE

Disponibilité des services de santé infantile

Parmi tous les hôpitaux, centres de santé et postes de santé (N=363), pourcentage offrant :




8 structures de santé sur **10** offrent tous les trois services de santé infantile de base.

COUVERTURE VACCINALE

Vaccination des enfants par région

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu BCG, rougeole, fièvre jaune, 3 doses de Pentavalent et 3 doses de polio



Ces résultats sont basés sur les données agrégées de 2012-2013 et 2014



© UNICEF/2009/J. Pudlowski



3 enfants sur **4** ont reçu tous les vaccins recommandés.

DISPONIBILITÉ DES VACCINS


Disponibilité des vaccins

Parmi les hôpitaux, centres de santé et postes de santé qui offrent les services de vaccination infantile et stockent les vaccins de façon routinière dans la structure (N=279), pourcentages ayant tous les vaccins infantiles de base non périmés observés le jour de l'enquête

86 % des structures de santé offrant des services de vaccination et stockant des vaccins disposent de tous les vaccins infantiles de base.



28 % des prestataires ont reçu une formation sur PEV/ Chaîne du froid au cours de 24 derniers mois.



© Doctor by Andrew McKinley et icônes avec la permission de The Noun Project


Évaluation, examen médical et conseils essentiels

Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de santé ont été observées (N=1 212), pourcentage pour lesquels :


ÉVALUATION DES SIGNES GÉNÉRAUX DE DANGER




ÉVALUATION DU SYMPTÔME PRINCIPAL




EXAMEN MÉDICAL



CONSEILS ESSENTIELS POUR LES RESPONSABLES DE L'ENFANT



Près de **1** enfant sur **5** souffre de malnutrition chronique.




Aucune des consultations observées n'a compris une évaluation de tous les signes généraux de danger.

38 % des consultations observées ont compris une évaluation de tous les 3 symptômes principaux.


NUTRITION

Fréquence des services de suivi de la croissance par région

Parmi les hôpitaux, centres de santé et postes de santé offrant des services de suivi de la croissance (N=305), pourcentage offrant ces services cinq jours ou plus par semaine



PALUDISME




© Baby, Baby Care by Saeed Farrahi avec la permission de The Noun Project

Plus de **2** enfants sur **5** ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit dernière.

Prévalence du paludisme par région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant été testés positifs pour le paludisme selon la microscopie




Ces résultats sont basés sur les données agrégées de 2012-2013 et 2014

CAPACITÉ DE DIAGNOSTIC ET MÉDICAMENTS

Diagnostic du paludisme selon la région

Parmi les hôpitaux, centres de santé et postes de santé offrant le diagnostic et/ou le traitement du paludisme (N=359), pourcentage qui disposent des kits TDR ou la microscopie



© Hospital by Majo Ox avec la permission de The Noun Project

79 % des structures de santé offrant des services du paludisme ont l'ACT de première intention préparation pédiatrique disponible.