

# TCHAD

## Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-MICS) 2014-2015


### Santé de la reproduction

La proportion de mères qui ont effectué au moins les 4 visites prénatales recommandées et la proportion de naissances qui ont eu lieu dans un établissement de santé ont augmenté depuis 1996-1997. Le rapport de mortalité maternelle est estimé à 860 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

#### Tendances des soins de santé maternelle

Pourcentage des :

■ EDST 1996-1997 ■ EDST 2004 ■ EDS-MICS 2014-2015




### Mortalité des enfants

En 2014-2015, près de 1 enfant sur 8 n'atteint pas son cinquième anniversaire.

#### Mortalité des enfants

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de cinq ans avant l'enquête




### Paludisme

Près de 8 ménages sur 10 (77 %) possèdent une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII). Plus d'un tiers des enfants de moins de cinq ans (36 %) et 35 % des femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête.

#### Possession et utilisation des moustiquaires préimprégnées d'insecticide (MII)

Pourcentage de :




### VIH/Sida

La prévalence du VIH parmi les adultes de 15-49 ans est de 1,6 %. La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes (1,8 %) que chez les hommes (1,3 %). De plus, la prévalence du VIH est plus de sept fois plus élevée en milieu urbain (4,3 %) qu'en milieu rural (0,6 %).

#### Prévalence du VIH selon le milieu de résidence

Pourcentage des femmes et des hommes de 15-49 ans séropositifs

■ Tchad ■ Urbain ■ Rural




### Vaccination des enfants

La proportion d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins de base est plus de deux fois plus élevée en 2014-2015 (25 %) qu'en 1996-1997 (11 %). De même, la proportion d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin a sensiblement baissé au cours de la même période.

#### Tendances de la vaccination des enfants

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu :

■ EDST 1996-1997 ■ EDST 2004 ■ EDS-MICS 2014-2015



(BCG, rougeole, 3 doses de Pentavalent/DTCoq et 3 doses de polio)