





Prévalence du faible niveau d'hémoglobine chez les enfants selon l'âge

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois avec un niveau d'hémoglobine <8g/dl



Prévalence du paludisme chez les enfants par région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant testé positifs pour le paludisme selon la microscopie



Taux de couverture et méthodologie : Tous les enfants de 6-59 mois des ménages sélectionnés étaient éligibles pour subir le test d'hémoglobine et les tests de dépistage du paludisme. Pour le diagnostic du paludisme, deux prélèvements de sang capillaire ont été effectués : un Test de Diagnostic Rapide (TDR) et un examen microscopique. La mesure de niveau d'hémoglobine pour l'anémie a été effectuée en utilisant le système HemoCue. Parmi les 5 594 enfants éligibles, 99 % ont subi ces tests biologiques.

Pour tous renseignements concernant l'EIPBF 2017-2018, contacter :

Au Burkina Faso :

Direction Générale de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 01 BP 374, Ouagadougou 01, Burkina Faso ; téléphone : (+226) 25 49 85 02 ; fax : (+226) 25 376226 ou 25 376204 ; email : insd@insd.bf ou insdbf@yahoo.fr ; internet : <http://www.insd.bf>.

Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS), 03 BP. 7062 Ouagadougou 03 ; téléphone : (+226) 25 30 88 46 / 25 30 52 56 ; fax : (+226) 25 31 17 08 ; email : pads@fasonet.bf

Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), 01 BP 9524, Ouagadougou 01, Burkina Faso ; téléphone : (226) 25 36 26 53.

Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP), 01 BP 2208, Ouagadougou 01, Burkina Faso ; téléphone : (226) 25 324695/25 324696 ; internet : <http://www.cnrfp.bf>.

Aux États-Unis :

The DHS Program
530 Gaither Road, Suite 500; Rockville, MD 20850 USA
Telephone: +1-301-407-6500; Fax: +1-301-407-6501
Email: info@DHSprogram.com; www.DHSprogram.com

L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme a été réalisée au Burkina Faso, de novembre 2017 à mars 2018 (EIPBF 2017-2018). L'enquête a été exécutée par l'INSD avec l'assistance technique d'ICF, l'organisme américain en charge du programme international des EDS (Demographic and Health Survey), du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et du laboratoire Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP). L'EIPBF 2017-2018 a bénéficié de l'appui financier de l'USAID et du Fonds Mondial à travers le Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS).



Burkina Faso




Enquête sur les Indicateurs du Paludisme 2017-2018 (EIPBF)

Enquête sur les Indicateurs du Paludisme Burkina Faso (EIPBF) 2017-2018

Au cours de l'EIPBF 2017-2018, plus de 6 300 ménages ont été enquêtés sur la prévention du paludisme et on a testé plus de 5 500 enfants de 6-59 mois pour le paludisme et l'anémie. Les résultats sont représentatifs pour l'ensemble du pays, pour le milieu urbains et rural, pour Ouagadougou, et pour les 13 régions.


Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) par les ménages

Répartition (en %) des ménages



Tendances de la possession des MII

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins une MII



EDSBF-MICS 2010* EIPBF 2014* EIPBF 2017-2018

*Une MII est définie comme une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans l'EDSBF-III 2003, l'EDSBF-MICS IV 2010, et l'EIPBF 2014, les MII incluaient également des moustiquaires ayant été imprégnées d'insecticides ou trempées dans de l'insecticide au cours des 12 derniers mois.

Tendances de l'accès et l'utilisation des MII


Pourcentage de la population des ménages ayant accès à une MII et pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



EIPBF 2014* EIPBF 2017-2018


Utilisation des MII par les enfants par région

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



Tendances de l'utilisation des MII


Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes de 15-49 ans ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



EDSBF-MICS 2010* EIPBF 2014* EIPBF 2017-2018

Tendances de l'utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) pendant la grossesse

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant l'enquête qui ont reçu au moins 1, 2, ou 3 doses de SP pendant la dernière grossesse




EDSBF-MICS 2010 EIPBF 2014 EIPBF 2017-2018

79 % des enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre récemment qui ont pris des antipaludiques **ont reçu une CTA** (combinaison thérapeutique d'Arteminine) – **le traitement recommandé.**

Tendances de recherche de soins et des tests de diagnostic du paludisme

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines avant l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés et pour lesquels on a effectué un prélèvement de sang pour être testé



EDSBF-MICS 2010 EIPBF 2014 EIPBF 2017-2018