



Prevalência de anemia moderada-severa e malária por idade

Percentagem de crianças de 6-59 meses, com hemoglobina <8,0 g/dl e com resultado positivo para malária no teste de diagnóstico rápido (TDR)



Prevalência da malária nas crianças por província

Percentagem de crianças de 6-59 meses com resultado positivo no TDR



Para informações adicionais sobre o IIM 2018 podem ser obtidas no Instituto Nacional de Saúde, EN1, Bairro da Vila-Parcela no 3943, Província de Maputo, E-mail: ins.direccao@misau.gov.mz; Internet: www.ins.gov.mz

Para obter informações adicionais sobre o inquérito e The DHS Program, o favor de contactar ICF, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, U.S.A. Telephone: +1-301-407-6500; Fax: +1-301-407-6501; E-mail: info@DHSprogram.com; Internet: www.DHSprogram.com; www.statcompiler.com

O Inquérito Nacional sobre Indicadores de Malária (IIM 2018) foi implementado pelo Instituto Nacional de Saúde (INS), em estreita colaboração com o Programa Nacional de Controlo da Malária (PNM) e o Instituto Nacional de Estatística (INE). O apoio financeiro foi disponibilizado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), através da Iniciativa do Presidente dos Estados Unidos para o Controlo da Malária (PMI) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A assistência técnica foi garantida pela ICF, através The DHS Program, um projecto financiado pela USAID que oferece apoio e assistência técnica na implementação de inquéritos populacionais e de saúde em vários países do mundo.

Fotografia da capa: Azulejos © 2018 Hasan Almasi pelo Unsplash



Iniciativa do Presidente dos EUA Contra a Malária



Inquérito Nacional sobre Indicadores de Malária (IIM) 2018

Folheto



Moçambique


Taxas de resposta e metodologia: Das 4.409 crianças elegíveis, 98% foram testadas para malária (*P. falciparum*) usando o teste de diagnóstico rápido (TDR) e anemia usando o dispositivo HemoCue. Ambos testes foram realizados com base na amostra de sangue de uma picada no dedo ou calcanhar.

Inquérito Nacional sobre Indicadores de Malária de 2018

O objectivo do IIM 2018 é disponibilizar as estimativas de indicadores demográficos e de saúde básicos, relacionados com a malária. As informações recolhidas através do IIM 2018 destinam-se a ajudar os decisores políticos e gestores do programa de controle de malária na avaliação e concepção de estratégias para melhorar a saúde da população do país.

Posse de redes tratadas com insecticida (RTIs) por província


Percentagem de agregados familiares com, pelo menos, uma RTI



51% dos agregados familiares em Moçambique possuem uma RTI por cada duas pessoas que dormiram em casa na noite anterior ao inquérito.

Tendências no acesso e uso de RTI

Percentagem da população com acesso a uma RTI e que dormiu debaixo de uma RTI a noite anterior




Uma RTI é uma rede tratada pelo fabricante que não precisa de qualquer tratamento adicional. A definição de RTI usada no IDS 2011 e no IMASIDA 2015 incluiu todas as redes que foram embebidas em insecticida nos 12 meses anteriores ao inquérito.

16% dos agregados familiares beneficiaram de pulverização intra-domiciliária nos 12 meses anteriores ao inquérito. Maputo Província tem a proporção mais elevada com 33%.

Tratamento intermitente e preventivo (TIP) durante a gravidez segundo área de residência


Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um nado-vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que receberam SP/Fansidar durante a gravidez do último nado-vivo



Tendências no TIP

Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um nado-vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que receberam SP/Fansidar durante a gravidez do último nado-vivo

■ IDS 2011 ■ IMASIDA 2015 ■ IIM 2018



31% das crianças menores de cinco anos tiveram febre nas duas semanas anteriores à entrevista.

Tendências na procura de cuidados e no tratamento de crianças com febre

■ IDS 2011 ■ IMASIDA 2015 ■ IIM 2018

Entre crianças com febre que tomaram algum antimalárico, percentagem que:

