

Taux de couverture et méthodologie : Tous les enfants de 6-59 mois des ménages sélectionnés étaient éligibles pour subir le test d'hémoglobine et les tests de dépistage du paludisme. Pour le diagnostic du paludisme, un Test de Diagnostic Rapide (TDR) a été effectué. La mesure de niveau d'hémoglobine pour l'anémie a été effectuée en utilisant le système HemoCue. Parmi les enfants éligibles, 98 % ont été testés pour l'anémie et 98 % ont été testés pour le paludisme.



Pour tous renseignements concernant l'EIPN 2021, contacter :

Au Niger :
 L'Institut National de la Statistique (INS)
 BP 13416, Niamey, Niger
 Téléphone : (227) 20 72 35 60, Fax : (227) 20 72 2174
 Email : ins@ins.ne, Site web : www.ins.ne

Aux États-Unis :
 The DHS Program
 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA
 Téléphone : +1-301-407-6500, Fax : +1-301-407-6501
 Email : info@DHSprogram.com
 Site web : www.DHSprogram.com.


L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Niger (EIPN) a été réalisée en 2021 par l'Institut National de la Statistique (INS) en collaboration avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) du ministère de la Santé Publique (MSP). Le financement de l'EIPN 2021 a été assuré par le Gouvernement Nigérien, l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) dans le cadre de l'Initiative du Président des États-Unis contre le Paludisme (PMI), et Catholic Relief Services (CRS). ICF a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du DHS Program, financé par l'USAID, et dont l'objectif est de fournir un support et une assistance technique à des pays du monde entier pour la réalisation des enquêtes sur la population et la santé.

Le contenu de ce dépliant relève de la seule responsabilité de l'Institut National de la Statistique (INS) et de l'ICF et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USAID, du gouvernement des États-Unis ou d'autres organismes donateurs.

Photo de couverture : © 2020 PMI Impact Malaria


Prévalence d'anémie modérée-sévère selon le bien-être économique

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est <8 g/dl



Prévalence du paludisme selon l'âge

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont les résultats du TDR étaient positifs



Enquête sur les Indicateurs du Paludisme

2021



NIGER




Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Niger 2021

L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Niger (EIPN) fournit des informations détaillées sur le paludisme. Lors de l'EIPN 2021, 4 729 ménages et 5 795 femmes de 15-49 ans ont été enquêtés avec succès. De plus, tous les enfants âgés de 6-59 mois étaient éligibles pour les tests d'hémoglobine et du paludisme.


Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) par région

Pourcentage de ménages ayant au moins une MII



Tendance de la possession de MII


Pourcentage de ménages ayant au moins une MII



Dans les enquêtes EDSN 2006, EDSN 2012, et EIPN 2021 la définition d'une MII incluait les moustiquaires ayant été trempées dans un insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois.

Tendances d'utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes de 15-49 ans ayant utilisé une MII la nuit avant l'interview




Dans les enquêtes EDSN 2006, EDSN 2012, et EIPN 2021 la définition d'une MII incluait les moustiquaires qui ayant été trempées dans une insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois.

Entre 2006 et 2021, on observe une hausse importante du pourcentage de femmes ayant reçu de la Sulfadoxine pyriméthamine pour prévenir le paludisme pendant la grossesse.


Tendances de l'utilisation du TPIg par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête qui ont reçu au moins 1, 2 ou 3 doses de SP/Fansidar




Utilisation de MII par la population des ménages par région

Pourcentage de la population des ménages qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview



Accès et utilisation des MII par résidence

Pourcentage de la population des ménages ayant accès à une MII et pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



Diagnostic et recherche de soins pour des enfants avec de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre, pourcentage pour lesquelles

