

# Cameroun



Pour tous renseignements concernant l'EIPC 2022, contacter :

## Au Cameroun :

Institut National de la Statistique (INS),  
BP 134, Yaoundé, Cameroun ; téléphone : +(237) 2 22 22 04 45 ;  
fax : +(237) 2 22 23 24 37 ; internet : [www.ins-cameroun.cm](http://www.ins-cameroun.cm) ;  
email : [infos@ins-cameroun.cm](mailto:infos@ins-cameroun.cm).

## Aux États-Unis :

The DHS Program  
530 Gaither Road, Suite 500; Rockville, MD 20850 USA  
Telephone : +1-301-407-6500; Fax : +1-301-407-6501  
Email : [info@DHSprogram.com](mailto:info@DHSprogram.com); [www.DHSprogram.com](http://www.DHSprogram.com)

L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Cameroun (EIPC) a été réalisée du 22 août au 1er décembre 2022 par l'Institut National de la Statistique (INS) en étroite collaboration avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP). Le financement de l'EIPC 2022 a été assuré par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) à travers l'Initiative Présidentielle des États-Unis contre le Paludisme (PMI) et le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (Le Fonds Mondial). ICF a fourni l'assistance technique par le biais de The DHS Program, un projet financé par l'USAID qui fournit un support et une assistance technique pour la réalisation d'enquêtes dans les domaines de la population et de la santé dans de nombreux pays dans le monde.

Le contenu de ce rapport n'engage que l'INS, le PNL et ICF et ne constitue pas nécessairement le point de vue du PMI, du Gouvernement des États-Unis ou du Fonds Mondial.

Photo : Moustique Anophèle. © 2014 Bibliothèque d'Images de Santé Publique du CDC/James Gathany. Domaine public


## Enquête sur les Indicateurs du Paludisme 2022



**Taux de couverture et méthodologie :** Tous les enfants de 6-59 mois des ménages sélectionnés étaient éligibles au test d'hémoglobine et à celui de dépistage du paludisme. Pour le diagnostic du paludisme, un Test de Diagnostic Rapide (TDR) a été effectué. La mesure du niveau d'hémoglobine pour l'anémie a été effectuée en utilisant le système HemoCue. Parmi les enfants éligibles, 97 % ont été testés pour l'anémie et 97 % ont été testés pour le paludisme.


## Prévalence du paludisme selon la région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat du TDR est positif



## Tendance de la prévalence de faible niveau d'hémoglobine

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est <8 g/dl




# Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Cameroun (EIPC 2022)

L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Cameroun de 2022 (EIP Cameroun 2022) fournit une mise à jour des informations sur la morbidité liée au paludisme et la couverture des interventions de lutte, mesurées au niveau des ménages. Lors de l'EIP Cameroun 2022, 6 031 ménages et 6 532 femmes de 15-49 ans ont été enquêtés. De plus, les enfants de 6-59 mois étaient éligibles pour les tests d'hémoglobine et du paludisme.


## Possession des MII selon la région

Pourcentage des ménages avec au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI)



## Tendances de l'accès et l'utilisation des MII


Pourcentage de la population des ménages ayant accès à une MI et ayant dormi sous une MI la nuit avant l'interview



\*Note: Dans les enquêtes EDS au Cameroun jusqu'en 2011, la définition d'une MI incluait les moustiquaires ayant été trempées dans un insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois. Depuis 2011, toutes les moustiquaires distribuées sont des Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action (MILDA).

## Utilisation des MII selon la résidence


Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes de 15-49 ans ayant dormi sous une MI la nuit dernière



**3 sur 10** des enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines avant l'interview.

## Tendances de l'utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes


Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes de 15-49 ans ayant dormi sous une MI la nuit avant l'interview



\*Note: Dans les enquêtes EDS au Cameroun jusqu'en 2011, la définition d'une MI incluait les moustiquaires ayant été trempées dans un insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois. Depuis 2011, toutes les moustiquaires distribuées sont des Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action (MILDA).


## Tendances de la couverture du traitement préventif intermittent

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant l'enquête qui ont reçu au moins 1, 2, ou 3 doses de SP/Fansidar



## Utilisation du Traitement Préventif Intermittent (TPIg) selon la région

Pourcentage de femmes enceintes ayant reçu 3+ doses de SP/Fansidar



## Diagnostic et recherche de soins pour des enfants avec de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre, pourcentage pour lesquels

