

## ERRATUM

Ecole de Santé Publique de l'Université de Kinshasa (ESPK) [République Démocratique du Congo] et ICF. 2019. *République Démocratique du Congo: Evaluation des Prestations des Services de soins de Santé (EPSS RDC) 2017-2018*. Kinshasa, RDC et Rockville, Maryland, USA : ESPK et ICF.

Date of correction  
**April 12, 2019**

### **CHAPTER 8: VIH/SIDA ET INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES PAGE 227, 238, 249**

#### **Page 227 :**

- Environ quatre FOSA sur dix (37 %) offraient des services de traitement du VIH par les antirétroviraux (ARV). Parmi les FOSA offrant ces services, 66 % disposaient des directives sur le traitement par les ARV, 55 % d'au moins un prestataire ayant reçu une formation continue sur le traitement par les ARV au cours des 24 mois précédant l'enquête et 74 % sur les ARV de première ligne pour les malades adultes.

#### **Page 238 :**

##### **8.3.3 Disponibilité des ARV de première ligne pour les adultes**

Dans l'ensemble, plus de sept FOSA sur dix (74 %) offrant des services de TAR avaient tous les ARV de première ligne pour le traitement du VIH chez les adultes.

Cette disponibilité était la plus élevée dans les centres hospitaliers/cliniques (90 % comparativement à 67 % dans les CS) ainsi que dans les FOSA du secteur privé lucratif et non lucratif (respectivement 88 % et 89 % comparativement à 68 % dans celles du secteur public) et les FOSA du milieu urbain (89 % comparativement à 69 % dans celles du milieu rural). Dans les provinces, cette disponibilité était très variable.

**Tableau 8.6 Directives, personnel formé et éléments pour les services de thérapie antirétrovirale**

Parmi toutes les formations sanitaires, les pourcentages de celles offrant les services de thérapie antirétrovirale (TAR) et, parmi les formations sanitaires offrant les services TAR, les pourcentages de celles avec les éléments de support nécessaires pour assurer la qualité des services TAR, selon certaines caractéristiques, République Démocratique du Congo EPSS 2017-2018

Caractéristiques de base	Pourcentage de formations sanitaires offrant des services de TAR <sup>1</sup>	Effectif de formations sanitaires	Pourcentage de formations sanitaires offrant des services TAR qui ont :							Effectif de formations sanitaires offrant des services TAR
			Directives TAR	Prestataire formé <sup>2</sup>	ARV de première ligne pour adulte disponible <sup>3</sup>	Capacité de diagnostic en laboratoire pour :			Test de la fonction rénale ou hépatique	
						Numération formule sanguine complète <sup>4</sup>	Comptage cellules CD4	Charge virale		
<b>Type de formation sanitaire</b>										
Hôpital général de référence, hôpital tertiaire, hôpital	81	69	78	70	85	26	9	3	31	56
Centre de santé de référence	72	114	76	59	83	16	1	1	4	82
Centre hospitalier, clinique	64	67	69	70	90	29	2	0	34	43
Centre de santé	29	1 131	61	50	67	5	0	3	1	325
<b>Secteur d'appartenance</b>										
Public	37	844	62	50	68	8	1	2	4	312
ONG/privé sans but lucratif	44	34	78	55	89	15	4	1	18	15
Privé lucratif	25	252	65	66	88	17	1	0	22	62
Privé confessionnel	46	249	76	64	78	18	1	4	11	116
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	47	306	70	58	89	14	3	6	18	143
Rural	34	1 074	65	54	68	10	1	1	4	363
<b>Province</b>										
Bas-Uélé	43	20	73	72	83	1	0	0	1	9
Equateur	18	37	67	33	98	0	0	0	0	6
Haut-Lomami	33	42	66	41	85	0	2	0	1	14
Haut-Katanga	38	104	84	60	92	13	5	0	16	39
Haut-Uélé	70	32	47	86	87	7	0	1	1	23
Ituri	40	71	50	51	60	7	0	2	8	28
Kasaï	12	71	96	7	14	0	0	0	0	8
Kasaï-Central	34	58	72	23	53	2	0	0	3	20
Kasaï-Oriental	27	44	70	39	72	16	1	0	10	12
Kinshasa	55	106	69	69	91	19	3	6	19	58
Kongo-Central	43	88	56	88	70	25	1	0	11	38
Kwango	41	33	54	41	72	5	0	0	3	14
Kwilu	38	77	61	37	53	6	1	0	5	29
Lomami	45	42	51	39	55	12	0	0	2	19
Lualaba	19	44	94	70	90	13	3	27	10	8
Mai-Ndombe	30	38	94	18	77	9	3	2	6	11
Maniema	65	37	47	56	83	3	1	0	2	24
Mongala	8	37	83	88	29	0	0	0	0	3
Nord-Kivu	58	107	69	60	72	21	1	7	7	61
Nord-Ubangi	14	21	16	84	24	0	0	0	4	3
Sankuru	23	33	98	54	100	6	0	0	6	7
Sud-Kivu	30	86	64	73	56	11	0	0	11	25
Sud-Ubangi	16	32	93	44	67	11	0	2	7	5
Tanganyika	59	34	49	32	79	2	1	0	1	20
Tshuapa	4	29	78	28	67	0	11	0	0	1
Tshopo	32	56	85	37	83	6	1	0	8	18
Ensemble	37	1 380	66	55	74	11	1	2	8	505

Note : Les mesures présentées dans ce tableau comprennent les indicateurs inclus dans les domaines « personnel et formation ; diagnostic ; médicaments et produits », utilisés pour évaluer l'état de préparation des formations sanitaires à fournir les soins et services de soutien aux PVVIH selon la méthodologie d'évaluation des systèmes de santé proposée par l'OMS et l'USAID (2015).

<sup>1</sup> Prestataires dans la formation sanitaire qui prescrivent les ART pour les patients VIH/Sida ou fournissent des services de suivi de traitement pour les personnes sous ART, y compris fournir les services dans la communauté

<sup>2</sup> La formation sanitaire a au moins un prestataire interviewé fournissant les services des ART qui déclare avoir reçu une formation continue dans certains aspects des ART au cours des 24 mois précédant l'enquête. La formation doit comprendre des séances structurées, et n'inclut pas une formation individuelle que le prestataire aurait reçue au cours d'une supervision de routine.

<sup>3</sup> La formation sanitaire dispose des trois ARV de première ligne (TDF+3TC+EFV), spécifiques au pays pour le traitement du VIH chez les adultes

<sup>4</sup> La formation sanitaire a un analyseur d'hématologie fonctionnel ou un compteur hématologique fonctionnel avec les réactifs nécessaires disponibles dans la formation sanitaire.